

## Maladie de MORTON

Tumeur vasculo-nerveuse, un névrome  
traumatique avec:

- Filets nerveux hyperplasiques avec des terminaisons nerveuses
- En périphérie, du tissu fibro-adipeux
- Des anomalies artérielles importantes

Les crises sont des épisodes de vasodilatation et  
les crises cessent quand le névrome s'est vidé  
de son sang

C'est un traumatisme du nerf plantaire entre les têtes métatarsiennes sollicitées lors de la marche par des mouvements transversaux dans des chaussures fermées

+ chez la femme

- 3ème espace 71%

- 2ème espace 29%

- névromes bilatéraux 49%

## Examen clinique

### MANŒUVRE DES DEUX MAINS:

Une main pince espace entre deux têtes d'arrière en avant et l'autre main exerce des pressions transversales sur la palette des métas  
Diag différentiel : douleur aigu du 2 ou 3 rayon, ostéochondrite de la 2 ou 3 tête méta, bursite sous méta –phalangiennne moyenne.

# Syndrome du carrefour postérieur de la cheville

- Ligament talo-fibulaire postérieur
- tendon du long fléchisseur de l'hallux
  - franges synoviales des récessus postérieurs de la tibio-tarsienne et sous talienne
- paquet vasculo-nerveux tibial postérieur qui passe entre le LFPH et le FCO
  - éventuels kyste synovial ou muscle surnuméraire ou faisceau ectopique

## Syndromes de compression osseuse

- Fracture de Shefert et Cloquet:
- Fracture du processus postéro-latéral du talus
  - Fracture os trigone
- Compression sans fracture du processus postéro-latéral
  - Conflit direct tibio-calacnéen

# Syndrome de pincement de tissus mous

- franges synoviales
- muscle surnuméraire ou  
implantation basse de fibres  
musculaires sur les tendons
- Kyste synovial
- ténosynovite du tendon du LFH

## Maladie de Ledderhose

- Dystrophie de l'aponévrose plantaire superficielle caractérisée par un épaissement nodulaire ( tumeur bénigne non inflammatoire- équivalent du Dupuytren à la main) en arrière tête du 1<sup>er</sup> méta.
- douleur – Infiltration – exérèse

# Entorse tibio-talienne latérale

- radio demandée si:

incapacité du patient à faire deux  
pas sur chaque pied sans aide  
dans l'heure suivant le trauma



-réveil d'une douleur à la palpation de la moitié postérieure d'une des deux malléoles sur une hauteur de 6cm en partant de la pointe

- Réveil d'une douleur à la palpation de la styloïde du 5 ou du scaphoïde tarsien

Jo : glacage, repos, élévation,  
compression

J3-J5: Choix de la contention

Entorse médio-tarsienne

Marshall : subluxation du cuboïde  
chez la danseuse professionnelle

Fractures bimalléolaires

Fracture du dome talien

Fracture base 5ème méta

Fracture sésamoïde

Rupture du tendon d'Achille

Rupture du LFH

Rupture de l'aponévrose plantaire

Rupture du tibial postérieur

Luxation du tendon du tibial  
postérieur ( danseur)

Luxation du Long fibulaire

Tendinopathies de tous les tendons

- Ta – TP – TA – LFH- LEH-

LF(pieds varus)- CF

Bursite retro-achilléenne

Syndrome du carrefour antérieur -  
Conflit tibio talien dans le talus  
forcé ( saut, plié)

Synovite de la cheville :  
hypersollicitation mécanique se  
traduisant par des douleurs antéro-  
médial ou latéral

Synovite Villo Nodulaire : affection  
tumorale –géode

Synovite rhumatismale: polyarthrite  
rhumatoïde, spodylarthrite  
ankylosante

Arthrite septique

Ostéocondrite disséquante du talus  
Fractures de fatigue (méta le +souvent:  
Base 1er, 2ème et 5ème)  
Aponévrosite plantaire (insertion  
calcanéenne interne)  
Névralgie du saphène latéral (douleur  
type de brûlure réveillée à la palpation)  
Apophysites d'insertions de l'enfant  
(Naviculaire, 5 méta)  
Scaphoïdite tarsienne-4à7ans



Maladie de Sever: apophyse  
calcanéenne

postérieure(osteocondrose de  
croissance)

Maladie d'Iselin-Setter : base  
5ème méta.

Maladie de Freiberg : tête 2ème  
méta

Maladie de Renander : sésamoïde

Footballeur:

-Exostose antérieure:

« impingement syndrome »

-Arrachement canalfibreux  
cuboidien( arrachement osteo-  
periosté cuboide)

-Arthrose

Syndromes canaux: Douleurs à type de picotements, brûlures, paresthésies- face post de jambe(nerf sural), ou antéro-externe(nerf musculo cutané)

Pathologie organe d'équilibration  
:proprioceptif et extéroceptif

- TFD
- Romberg
- Quadrilatère pelvi-pédieux
  - Appui uni podal